

HEADLAND

Hi-Phos

PK Gübre Çözeltisi

0 – 30,5 – 5,1 (5,5 MgO)

EC FERTILIZER

Garanti edilen içerik (% w/w)


Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: 30,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: 5,1
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: 5,5

NET 1,4 Kg
HACİM 1 Litre

Üretici Firma

Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre Flintshire CH5 2DH, United Kingdom
Tel: + 44 (0) 1244 537370; Fax: + 44 (0) 1244 532097; İngiltere
enquiry@headlandgroup.com; www.headland-ag.co.uk

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



16.05.2011

Bitkinin gelişme dönemlerinde yoğun olarak kullandığı fosfor, potasyum ve magnezyum ihtiyacını karşılar. Her türlü üründe yapraktan uygulanabilir.

Kullanım Dozu ve Uygulama Zamanı:

Headland Hi-Phos yapraktan uygulamalarda 200-300 cc/100 L su dozunda kullanılabilir.

Narenciye: Meyve tutum döneminden başlayarak, meyve gelişim dönemi boyunca 250 cc/100 L su dozunda 2-3 uygulama yapınız.

Bağ: 1. uygulamayı çiçeklenmeden önce 300 cc/100 L su dozunda yapınız. Uygulamayı aynı dozda 14 gün aralıklarla 1-2 kez tekrarlayınız.

2. uygulamayı meyve tutumundan sonra 250 cc /100 L su dozunda yapınız. Uygulamayı aynı dozda 14 gün aralıklarla 1-2 kez tekrarlayınız.

Muz: İlkbahar döneminden başlayarak 300 cc/100 L su dozunda 15 gün aralıklarla 2 uygulama yapınız.

Elma & Armut, Erik,Kayısı : Herbir üründe 200 – 300 cc/100 L su dozunda 3-4 uygulama yapınız Meyve tutumundan itibaren aynı dozda 15 gün aralıklarla uygulamayı tekrarlayınız

Patates: Yumru sayısını arttırmak amacıyla ilk uygulamayı yumru oluşum evresinde , 300 cc/100 L su dozunda uygulayınız. Yumru büyüklüğünü arttırmak için 3 hafta sonra aynı dozda uygulamayı tekrarlayınız.

Çilek: Şaşırtmadan sonra 200-300 cc/100 L su dozunda uygulayınız. Vegetatif gelişme dönemi boyunca aynı dozda 10 günde bir uygulamayı tekrarlayınız.

Domates: 6. yaprak çıktıktan sonra 250 cc/100 L su dozunda uygulayınız. Aynı dozda 10 gün aralıklarla uygulamayı tekrarlayınız.

Soğan: Dikimden sonra 60. günden itibaren 300 cc/100 L su dozunda uygulayınız. Aynı dozda 10-14 gün aralıklarla uygulamayı tekrarlayınız.

Sera Bitkileri: Çiçeklenmeden önce 200 cc/100 L su oranında uygulayınız. Aynı dozda 15 gün aralıklarla uygulamayı tekrarlayınız.

Uygulama : Kullanmadan önce çalkalayınız. Önerilen dozda ürünü, tanktaki suya ekleyiniz ve karıştırınız. Bekletmeden uygulayınız.

Karışabilirlik: Deniz yosunlu, boron etanolaminli ürünlerle ve diğer alkali bileşiklerle karıştırmayınız. Önerilen dozu asla aşmayınız. Diğer zirai kimyasallarla karışabilir. Karıştırmadan önce küçük bir kaptaki test yapınız.

Depolama Koşulları: Orijinal ambalajında ağzı kapalı şekilde saklayınız. Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutunuz. Koruyucu gözlük, maske ve eldiven kullanınız. Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, 5-30 °C de saklayınız. Dondan koruyunuz. Boş şişeleri uygun şekilde imha ediniz.

Parti No :

Lisans No: 402

Tescil No :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

İthalat ve Dağıtım:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eski Kemalpaşa Yolu, Pınar Süt Yanı

PINARBAŞI-İZMİR

Tel:(232) 4362021 Fax: (232) 4362022

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.