

# Verdicrop Fe-EDTA

**Demir şelatı-EDTA**

**EC FERTILIZER**

**Garanti edilen içerik (% w/w)**

**Suda Çözünür Demir (Fe) : 13**  
**EDTA ile Şelatlı Demir (Fe) : 13**

**Şelatın stabil olduğu pH aralığı : 4 - 7**

**NET 1 Kg**

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.  
Sadece gerekli olan durumlarda kullanınız.

Üretici Firma

Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre Flintshire CH5 2DH, United Kingdom.  
Tel: + 44 (0) 1244 537370; Fax: + 44 (0) 1244 532097; İngiltere  
[enquiry@headlandgroup.com](mailto:enquiry@headlandgroup.com); [www.headland-ag.co.uk](http://www.headland-ag.co.uk)

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüdedik, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

**Topraktan uygulama:** 400-800 gr/da, ekim,şışırtma veya bitki gelişme döneminin başlangıcında.

**Meyve ağaçları:** 500-1000 gr/da, kış sezonu sonunda.

**Çilek:** 500-1000 gr/da, şışırtma öncesi veya bitki gelişme döneminin başlangıcında.

**Sebzeler:** 300-800 gr/da, ekim veya şışırtma öncesi ya da bitki gelişme döneminin başlangıcında.

**Bağlar:** 1-2 kg/da, kış sezonu sonunda.

### **Sulama suyu ile uygulama:**

**Meyve ağaçları:** 400-800 gr/da, toplam doz olup 15 gün aralıklarla ilk sulama suları ile verilmelidir.

**Çilek:** 400-800 gr/da, toplam doz olup 15 gün aralıklarla ilk sulama suları ile verilmelidir.

**Sebzeler:** 400-800 gr/da, toplam doz olup 15 gün aralıklarla ilk sulama suları ile verilmelidir.

**NOT:** Her uygulama başına 10 gr/100 litre su dozu aşılmamalıdır.

**Yaprak gübrelemesi:** Eksiklik belirtileri görülmeye başlandığında her uygulamada 100-200gr/da.

**Tarla bitkileri:** 3x100 gr/da, eksiklik belirtileri görülmeye başlandığında uygulanır.

**Yonca vs.yem bitkileri:** 100-200 gr/da, eksiklik belirtileri görülmeye başlandığında uygulanır.

**Patates ve yumru bitkileri:** 100-200 gr/da, eksiklik belirtileri görülmeye başlandığında uygulanır.

**Sebzeler:** 2-5 gr/m<sup>2</sup>, yeterli yapraklanma olduğunda uygulanır.

**Meyve ağaçları:** 0,5-2 gr/100 meyve fidanı; 25-100 gr/ağaç dozunda, ilkbahar başlangıcında verilir.

**Bağlar:** 2x100-200 gr/da çiçeklenme öncesi ve 2x100-200 gr/da çiçeklenme sonrası uygulanır.

- Çiçeklenme süresince uygulama yapılmamalıdır.

## **DİĞER KİMYASALLARLA KARIŞABİLİRLİK**

Diğer kimyasal gübrelere ve tarım kimyasalları ile karıştırılabilir.Karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

## **RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Çocuklardan uzak tutunuz.

Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora baş vurunuz.

Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız.

Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.

## **DEPOLAMA KOŞULLARI**

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, 5-35 °C sıcaklıkta saklanmalıdır.

Taşıma ve depolama esnasında dikkatli olunmalıdır.

Parti No :

Lisans No:402

Üretim Tarihi :

Tescil No :

Son Kullanma Tarihi :

## **İthalat ve Dağıtım:**

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eski Kemalpaşa Yolu, Pınar Süt Yanı

PINARBAŞI-İZMİR

Tel:(232) 4362021 FAX: (232) 4362022

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

